

## ■ 低血糖時の対応：服薬指導例

### ◎ 口からの摂取が可能な場合

- ブドウ糖 (5 ～ 10g、砂糖の場合は少なくともブドウ糖の倍量) または



ブドウ糖を口に含む場合は、100～200mlの水を飲んでください。  
 砂糖の場合は、ブドウ糖よりも少なくとも2倍量の水を飲んでください。  
 錠剤の場合は、水で飲む必要があります。錠剤がブドウ糖や砂糖よりも効果的に吸収されるまで待つ必要はありません。

- 錠剤が飲み込めず、錠剤が口中で溶け出す場合は、水を飲んでください。  
 錠剤が口中で溶け出す場合は、錠剤を一嚥せしてください。

### ◎ 口からの摂取が不可能な場合

- 錠剤が口中で溶け出す場合は、水を飲んでください。
- 口中で溶け出す錠剤が口中で溶け出す場合は、100～200mlの水を飲んでください。  
 錠剤が口中で溶け出す場合は、錠剤を一嚥せしてください。



- 錠剤が口中で溶け出す場合は、水を飲んでください。錠剤が口中で溶け出す場合は、錠剤を一嚥せしてください。

## 5 経口血糖降下薬の配合剤 一覧表

糖尿病の分野においても配合剤の使用頻度が増えています。

配合剤が処方された際には、一覧表より配合成分と含量を確認しましょう。

		メトホルミン塩酸塩		ピオグリタゾン	
		250mg	500mg	15mg	30mg
メタクト® 配合錠LD	15mg		メタクト® 配合錠LD		
メタクト® 配合錠LD	15mg		メタクト® 配合錠LD		
メタクト® 配合錠LD	15mg	メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD		
メタクト® 配合錠LD	15mg		メタクト® 配合錠LD		
メタクト® 配合錠LD	15mg	メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD		
メタクト® 配合錠LD	15mg			メタクト® 配合錠LD	
メタクト® 配合錠LD	15mg				メタクト® 配合錠LD
メタクト® 配合錠LD	15mg			メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD
		メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD
		メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD	メタクト® 配合錠LD
メタクト® 配合錠LD	15mg	メタクト® 配合錠LD			
メタクト® 配合錠LD	15mg		メタクト® 配合錠LD		
メタクト® 配合錠LD	15mg			メタクト® 配合錠LD	
メタクト® 配合錠LD	15mg				メタクト® 配合錠LD

© 2019 株式会社ファルマスタッフ